
Hälsobarometern

tredje kvartalet 2001

Nya långtidssjukskrivningar



Antalet nya långtidssjukskrivningar* ökade med 12 procent under de tre första kvartalen, jämfört med samma period förra året.

Ökningstakten är avtagande, 1999 och 2000 var motsvarande ökning 27 procent respektive 28 procent.

Andelen nya sjukfall med diagnoserna depression, reaktion på svår stress och utbrändhet är 31 procent de tre första kvartalen i år, motsvarande för 1999 och 2000 var 17 respektive 28 procent. Diagnoserna depression, reaktion på svår stress och utbrändhet uppvisar en stigande andel av långtidssjukskrivningarna.

De vanligaste diagnoserna inom respektive åldersgrupp

Diagnos	*<35år*	*35-44år*	*45-54år*	*55-59år*	*>59år*	*Totalt*
Reaktion på svår stress	19 %	19 %	16 %	8 %	7 %	14 %
Depression	14 %	15 %	11 %	8 %	6 %	11 %
Utbrändhet	5 %	7 %	7 %	4 %	2 %	6 %
Ryggvärk	4 %	6 %	5 %	6 %	8 %	6 %
Nack-, skulder-, armvärk	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	4 %
Generell muskelvärk	2 %	3 %	3 %	3 %	2 %	3 %

Tabellen visar de sex vanligaste diagnosernas andel av antalet nya långtidssjukskrivningar de tre första kvartalen 2001 samt diagnosernas andel inom respektive åldersgrupp. Den vanligast förekommande diagnosen de tre första kvartalen i år är reaktion på svår stress.


Gemensamt för diagnoserna depression, reaktion på svår stress och utbrändhet är att de yngre åldersgrupperna har den högsta andelen. Andelen insjuknade med diagnosen ryggvärk ökar med stigande ålder. För nack-,skulder- och armvärk samt generell muskelverk är det andelsmässigt mindre skillnader mellan åldersgrupperna.

* Med nya långtidssjukskrivningar avses här sjukskrivningar längre än 90 dagar.



Källa: Alecta.
Hälsobarometern baserar sig på tjänstepensionsföretaget Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland de 620 000 privatanställda tjänstemännen försäkrade inom ITP.

Förändringen av antalet nya långtidssjukskrivningar mellan de tre första kvartalen 2000 och 2001




Diagrammet visar förändringen av antalet nya långtidssjukskrivningar mellan de tre första kvartalen 2000 och 2001.Totalt ökade antalet nya långtidssjukskrivningar de tre första kvartalen med 12 procent (17 procent för kvinnor och 5 procent för män).

Samtliga åldersgrupper uppvisar en ökning av antalet nya långtidssjukskrivningar förutom åldersgruppen äldre än 59 år.

Det är endast i åldersgruppen yngre än 35 år som långtidssjukskrivningarna ökar mer bland män än bland kvinnor. Eftersom det finns flest nya långtidssjukskrivningar i de äldre åldersgrupperna så får den kraftiga ökningen av antalet nya sjukfall i de yngre åldersgrupperna inte så stort genomslag totalt.

Branschstatistik


Förändring av antalet nya långtidssjukskrivningar 1999-2000



Under år 2000 ökade antalet nya långtidssjukskrivningar i branschen radio- och programverksamhet samt nyhetsservice med hela 70 procent. Särskilt stor var ökningen av antalet nya långtidssjukskrivningar bland höginkomstagare verksamma i mediebranchen.



Antalet nya långtidssjukskrivningar per 1000 försäkrade år 2000



I alla branscher är de nya långtidssjukskrivningarna fler per 1000 försäkrade bland personer över 45 år. I branschen radio- och programverksamhet samt nyhetsservice är skillnaden mellan unga och gamla störst. Bland 1000 försäkrade över 45 år verksamma i mediebranschen insjuknade 49 personer. Tydligt är att de nya långtidssjukskrivningarna i denna grupp till övervägande del är stressrelaterade.

