



Pressmeddelande från Pfizer AB
Sollentuna 31 mars 2009

Ny studie visar:

Champix säkert och effektivt för rökare med hjärt- och kärlsjukdom

Bland rökare med stabil hjärt- och kärlsjukdom är det tre gånger så många som blir rökfria med Champix jämfört med dem som får placebo. Det visar en ny studie som presenteras idag på den internationella hjärtkonferensen ACC i Florida. Studien är den första som omfattar patienter med diagnostiserad stabil hjärt-kärlsjukdom och som röker. Varje år dör 6 500 personer till följd av rökning varav många har hjärt- och kärlsjukdomar.

Studien visar att 47 procent av patienterna med kardiovaskulära sjukdomar som rökte och som behandlades med Champix (vareniklin) slutade röka och förblev rökfria under behandlingens sista fyra veckor (veckorna 9-12), jämfört med 13,9 procent i gruppen som fick placebo. Resultaten presenteras idag på den internationella hjärtkonferensen ACC (American College of Cardiology), i Florida.

- Detta är en mycket betydelsefull studie. Vi vet hur oerhört viktigt det är att hjälpa hjärt- och kärlsjuka patienter att sluta röka. Nu ser vi i en vetenskaplig och omfattande undersökning att Champix är ett säkert och effektivt läkemedel för denna utsatta patientgrupp. Det är viktigt att vi får in rökavvänjning som en självklar del i hjärtsjukvården, säger Kerstin Tolagen, kardiolog vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Resultatet överensstämmer med resultaten i fas III-studien som låg till grund för godkännandet av Champix. Den nya studien visar att Champix är lika säkert och effektivt för denna grupp patienter med en allvarlig sjukdomshistoria som för i övrigt friska rökare.

De patienter som deltagit i studien hade alla diagnostiserad stabil kardiovaskulär sjukdom. Diagnosen hade ställts minst två månader innan studien startade. Stabil kardiovaskulär sjukdom innebär att patienterna antingen har hjärtrelaterade bröstsmärtor (angina pectoris), haft hjärtinfarkt, opererats för kärlsjukdomar med exempelvis ballongsprängning, genomgått bypass operation, haft stroke eller en mindre blödning i hjärnan (TIA-attack). Det kan även omfatta så kallad "fönstertittarsjuka" (perifera vaskulära sjukdomar).

Studien, som är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad, omfattar 714 patienter i åldrarna 35-75 år som rökt i snitt tio eller fler cigaretter per dag året innan de deltog. Samtliga ville sluta röka. De fördelades slumpmässigt i en grupp som fick vareniklin (355 personer) och i en som fick placebo (359 deltagare). Studien undersökte primärt hur många i respektive grupp som förblev rökfria de sista fyra veckorna av de 12 veckor som studien pågick.

Efter 12 månader var 19,2 procent av de som fått vareniklin rökfria, jämfört med 7,2 procent som fått placebo.

- Var femte patient var rökfri efter ett år och detta är ett mycket bra resultat. Rökare i denna sjukdomsgrupp är ofta mycket tungt nikotinberoende och trots att de vet att rökning kan döda har de oerhört svårt att sluta. Resultaten från studien visar att denna typ av läkemedel är en viktig del i arbetet för en framgångsrik rökavvänjning. Det krävs också insatser med psykologiskt patientstöd och samhällsåtgärder som ger allt mindre utrymme för acceptans av rökning. Med sådana insatser kan andelen rökfria efter behandling öka ännu mer, säger Gunilla Bolinder tobaksforskare och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Fakta om Champix (vareniklin)

Champix är det första läkemedlet utan nikotin som utvecklats särskilt för rökavvänjning. Det lanserades i Sverige i december 2006 och hittills har drygt 9 miljoner rökare i världen behandlats med Champix, varav drygt 70 000 i Sverige. Champix har en dubbelverkande effekt genom att dels blockera nikotinreceptorerna vilket minskar belöningseffekterna av nikotin och dels minska abstinensbesvären. De vanligaste biverkningarna är illamående, sömnlöshet, livliga drömmar, huvudvärk och nedstämdhet. Se utförligare information på FASS.se

För mer information om studien eller om Champix, kontakta:

Petra Eurenus, kommunikationschef Pfizer AB, tel. 08-550 529 55

Christina Gip, medicinsk rådgivare Pfizer AB, tel. 08-550 523 88

Gunilla Bolinder, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, tel. 08-5177 28 43
eller 08-5177 0000

Kerstin Tolagen, överläkare på hjärtmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad, tel. 054-615000

Se även www.pfizer.se

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.